

# WORKER

## Insecticida - Nematicida

PQUA N° 2221 - SENASA

**Worker** es un insecticida de acción translaminar con prolongado efecto residual, actúa por contacto e ingestión. Para el control de ácaros y minadores de hoja en diferentes cultivos frutales y hortícolas. El producto está conformado por dos ingredientes activos, la abamectina y el tiametoxam.

### COMPOSICIÓN

Abamectina ..... 36 g/l

Thiamethoxam ..... 72 g/l

### MODO DE ACCIÓN

**Worker** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, dentro de la planta se traslada de manera translaminar hacia las dos caras de la hoja, por ello tiene buen efecto sobre insectos picadores chupadores y sobre insectos minadores.

### MECANISMO DE ACCIÓN

**Worker** está formado por dos ingredientes activos:

**Abamectina:** Inhibe la transmisión neuromuscular de los insectos, llevándolos a la parálisis muscular y una consecuente muerte.

**Thiamethoxam:** Actúa dañando el sistema nervioso (se une al receptor nicotínico de la acetilcolina y afecta la sinapsis) del insecto produciendo una parálisis y posteriormente la muerte.

### COMPATIBILIDAD

**WORKER** es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

**WORKER** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

### MÉTODO DE EMPLEO

Aplicar **WORKER** con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado.

## FRECUENCIA DE APLICACIÓN

**WORKER** se debe aplicar cuando se observen los primeros daños del insecto. Para mandarina realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días.

Se recomienda rotar con productos de diferentes modos de acción.

## PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

## RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

## PRESENTACIÓN

Frasco de 1 litro

## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis L/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.125	28	0.02 a 0.40 b
Cebolla	Nematodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	2.0	30	0.01 a 0.01 b
Vid	Nematodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	2.0	21	0.01 a 0.7 b

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

a: Abamectina

b: Thiamethoxam

Nota: Información proporcionada por el titular del registro.

Titular del registro:



País de origen:

**India**