

Basfoliar[®] Zn-flo

Corrector de deficiencia de Cinc

Basfoliar[®] Zn-flo es un fertilizante foliar líquido-floable, con alta concentración de cinc, está formulado como líquido floable, lo que permite ser usado en aplicaciones de bajo volumen de agua, sin riesgos de crear problemas de fitotoxicidad.

Datos técnicos:

Composición

Cinc (Zn) 750 g/l (75 % Cinc P/V)

Características Físicas y Químicas

Color

Blanco

Apariencia

Líquido pastoso

Densidad aparente:

1.70 a 20 °C

pH:

9 a 10

Miscibilidad

Basfoliar[®] Zn-flo puede ser mezclado en el tanque de pulverización con casi todos los productos fitosanitarios de uso corriente.

Presentación

Balde de 10 litros

Frasco de 1 litro

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO SUGERIDAS

Cultivo	DOSIS		N° de aplic	RECOMENDACIONES
	Hectárea	Cil. de 200 litros		
Basfoliar Zn -Flo	400 a 500 cc	100 a 200 cc	2	Al inicio del brotamiento, repetir a los 15 días.
Vid	750 cc	100 a 200 cc	2	1ª aplicación brote de 40 a 60 cm. 2ª aplicación inicio de flor.
Manzano	500 a 650 cc	80 a 100 cc	1	Aplicar al inicio de brotación.
Durazno	450 cc	60 cc	2	Iniciar aplicaciones post-cosecha repetir a los 15 días.
Cítricos	1 litro	100 cc	2 a 3	1ª aplicación crecimiento de brote, repetir en pre-floración.
Palto	1 litro	100 cc	2	1ª aplicación crecimiento de brote, repetir en pre-floración.
Mango	750 cc	150 cc	2	Realizar las aplicaciones en la fase de brotamiento.
Piña	350 a 500 cc	200 a 400 cc	2	1ª aplicación 60 días después del trasplante, repetir a los 60 días.
		150 a 250 cc	1	Aplicar antes de la floración.
Pecano aplicación foliar	1 litro	50 cc	1	45 días después del brotamiento.
Espárrago	400 a 500 cc	200 a 250 cc	2	1ª aplicación 30 a 40 días después de la cosecha, repetir a los 15 días.
Ají	500 cc	200 cc	2	1ª aplicación prefloración. Repetir a los 15 días.
Cebolla	500 cc	200 cc	2	30 y 45 días después del trasplante.
Ajo	500 cc	200 cc	2	30 y 60 días después de la siembra.
Maíz	250 a 500 cc	100 a 200 cc	1 a 2	1ª aplicación estado de 6 hojas, repetir a los 15 días.
Arroz	250 a 500 cc	100 a 200 cc	1 a 2	Aplicar a los 30 días del trasplante

Nota: Información proporcionada por el productor/proveedor.

Productor:



País

Alemania