

## **Basfoliar<sup>®</sup> ZnMn-flo**

### **Corrector de deficiencia de Cinc y Manganeseo**

**Basfoliar<sup>®</sup> ZnMn-flo** es un fertilizante foliar líquido-floable, con alta concentración de cinc y manganeseo, está formulado como líquido floable, lo que permite ser usado en aplicaciones de bajo volumen de agua, sin riesgos de crear problemas de fitotoxicidad.

#### **Datos técnicos:**

#### **Composición**

Cinc (Zn)	350 g/l (35 % Cinc P/V )
Manganeseo (Mn)	250 g/l (25 % Manganeseo P/V)

#### **Características Físicas y Químicas**

##### **Color**

Blanco

##### **Apariencia**

Líquido pastoso

##### **Densidad aparente:**

1.47 a 20 °C

##### **pH:**

8 a 9

#### **Miscibilidad**

**Basfoliar<sup>®</sup> ZnMn-flo** como el producto es de reacción alcalina, se recomienda aplicarlo sólo, en casos de ser necesaria una aplicación conjunta con otro fertilizante foliar y/o pesticida se recomienda siempre realizar un ensayo de miscibilidad con cantidades pequeñas de los productos previstos para la pulverización.

#### **Nota al comprador**

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto arriba mencionado, aplicado según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como su almacenamiento y aplicación está fuera de nuestro control y no podemos prever todas las circunstancias que surjan de ello, nosotros sólo nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento

## DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO SUGERIDAS

Cultivo	Dosis hectárea	Dosis cilindro	N° de aplic.	Recomendaciones de uso
Ajo	2 litros	300 cc	2	1era 30 días después del trasplante, repetir 30 días después.
Cebolla	2 litros	300 cc	2	1era 30 días después del trasplante, repetir 30 días después.
Cítricos	3 litros	250 cc	2 a 3	Aplicar en yema hinchada y después del cuajado.
Durazno	1.6 litros	200 cc	1 a 2	Aplicar en botón floral.
Fresa	1.2 litros	300 cc	1 a 2	Aplicar antes de floración.
Frutales - Plantaciones nuevas	0.5 litros	100 cc	1 a 3	Aplicar desde brote de 20 cm cada 15 días.
Manzano	1 litro	200 cc	1 a 2	Aplicar en botón floral.
Maíz	1 litro	300 cc	1 a 3	1era 30 días después del trasplante, repetir 15 días después.
Leguminosas	1 litro	300 cc	1 a 3	1era 30 días después del trasplante, repetir 15 días después.
Olivo	2 litros	300 cc	2 a 3	Aplicar en inicio de brotación hasta antes de floración.
Palto	3 litros	250 cc	2	Aplicar en yema hinchada y después del cuajado.
Vid	1.6 litro	200 cc	2	1era aplicación en brotes de 40 cm, 2da inicio de flor.

### Presentación

Balde de 10 litros

Frasco de 1 litro

Productor:



País

Alemania