

BASTET

Herbicida
PQUA N° 1945 - SENASA

BASTET es un herbicida sistémico de acción post emergente, altamente selectivo en el cultivo de arroz. Controla eficientemente especies de Echinochloa. La aplicación pre-emergente a la maleza permite que esta no germine, mostrando un efecto residual prolongado.

COMPOSICIÓN

Quinclorac..... 350 g/L

MODO DE ACCIÓN

BASTET es un herbicida sistémico de aplicación post-emergente de rápida absorción a través del sistema radicular y por las hojas. Tiene translocación basipetal y acropetal, acumulándose en los puntos meristemáticos.

MECANISMO DE ACCIÓN

BASTET actúa como regulador de crecimiento de las malezas, modificando el metabolismo en forma similar al ácido indolacético. También actúa inhibiendo el proceso de biosíntesis de la pared celular. Actúa sobre el tejido meristemático, inhibe la producción de carbohidratos causando clorosis en las hojas jóvenes.

COMPATIBILIDAD

BASTET es compatible con la mayoría de productos que contienen las mismas características. Es utilizado con otros herbicidas postemergentes selectivos al cultivo de arroz. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de hacer cualquier mezcla.

TOXICIDAD DEL PRODUCTO

BASTET no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

MÉTODO DE EMPLEO

Aplicar **BASTET** en post-emergencia temprana, con malezas de 1-2 hojas. Con Echinochloa de 3 a 4 hojas usar la dosis más alta. El terreno a aplicar debe estar con la humedad adecuada. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Para la preparación de la mezcla, se debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen de agua y continuar agitando hasta su homogenización.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave los equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIÓN

Frasco de 250 ml

Frasco de 1 Litro

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis L/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Cebadilla Moco de pavo	<i>Echinochloa colona</i> <i>Echinochloa cruz-galli</i>	1-2	79	5.0

PC: Período de carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos

Productor:



País

India