

120EC **BERETTA**

Herbicida
PQUA N° 893 - SENASA

Beretta® 120 EC es un herbicida de post emergencia sistémico y selectivo para un control efectivo de gramíneas anuales y perennes. **Beretta® 120 EC** se absorbe por vía foliar y se traslada a toda la planta. Los efectos de control del producto se observan de 1 a 3 semanas después de la aplicación dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales.

Composición

Clethodim.....126.4 g/l

MODO DE ACCIÓN

Beretta® 120 EC es absorbido por las hojas y trasladado a toda la planta es especial a los meristemas o yemas en crecimiento.

MECANISMO DE ACCIÓN

Beretta® 120 EC inhibe la acción del acetil coenzima A carboxilasa que es precursora de la biosíntesis de los lípidos. Afecta el sistema interno de las membranas de manera que las enzimas oxidativas e hidrolíticas del comportamiento liposomal, son liberadas y actúan sobre los constituyentes citoplasmáticos, produciendo la destrucción de la célula. En resumen, **Beretta® 120 EC** bloquea la síntesis de lípidos.

COMPATIBILIDAD

Beretta® 120 EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

TOXICIDAD: Categoría toxicológica

Toxicidad Oral:	LD50 (ratas) 1080 mg/kg
Toxicidad dérmica:	LD50 (ratas) > 2150 mg/kg
Toxicidad por inhalación:	LC50 (ratas) > 5.42 mg/l
Irritación cutánea:	Ligera irritación para la piel.
Irritación ocular:	Moderada irritación para los ojos.
Sensibilización:	No sensibilizante.

MÉTODO DE EMPLEO

Preparar una pre mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar de acuerdo al cultivo. Aplicar con cualquier equipo de aspersion, tratando de lograr una cobertura uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo una aplicación por campaña al año.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado y vierta la solución en la mezcla de aplicación.

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Maleza		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/200 l	l/ha		
Vid	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	0.5	1	15	1
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Rabo de Zorro	<i>Setaria geniculata</i>				
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				

PC: Periodo de carencia en días.

L.M.R. Límite máximo de residuos en partes por millón.

Productor:



País

Inglaterra