

Oficial

500 WG

Fungicida
PQUA N° 1172 – SENASA

Oficial[®] es un fungicida de acción sistémica local, traslaminar y de contacto que le permite ejercer un control preventivo y curativo de hongos ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y oomicetos.

COMPOSICION:

Azoxystrobin 500 g/litro

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida del grupo de las estrobirulinas que tiene acción sistémica y translaminar y de contacto inhibe la germinación de esporas y el desarrollo para el control de enfermedades provocadas por ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y oomicetos.

Oficial[®] controla enfermedades en el envés de las hojas cuando es aplicado en el haz. Luego de la aplicación del producto se consigue una distribución de forma acropetala del azoxystrobin logrando una mejor distribución del producto dentro de la planta

MECANISMO DE ACCIÓN

Azoxystrobin interfiere la respiración mitocondrial de las células del hongo patógeno evitando la transferencia de electrones entre el mitocondrio b y el citocromo c Inhibiendo la germinación de esporas y la movilidad de las zoosporas. También controla el crecimiento del micelio en germinación (estados iniciales del hongo).

COMPATIBILIDAD

Oficial[®] es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

DL ₅₀ Oral Aguda :	DL ₅₀ (ratas) > 2000 mg/kg
DL ₅₀ Dermal Aguda :	DL ₅₀ > 2000 mg/kg conejos
CL ₅₀ inhalatoria :	CL ₅₀ =4,3 mg/L aire
Irritación dermal :	No es irritante
Irritación ocular :	No es irritante ocular

MÉTODO DE EMPLEO

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia de pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo. No aplicar en plantas estresadas y enfermas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar tan pronto se observan los síntomas de la enfermedad. En vid realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña /año.

Máximo aplicar 0.2 Kg/Ha.

En caso se requiera una nueva aplicación rotar, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACION

Sobre de 100 gramos

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Malezas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Cil	L/Ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.06	-	3	2.0
Vid	<i>Oidium</i>	<i>Erisiphe necator</i>	-	0.1 - 0.2	14	2.0

UAC: Período de carencia

LMR. Límite máximo de residuos

Nota: Información proporcionada por el titular del registro.

Titular del registro:



País:

China