

PROFEZIN

250 WP

Insecticida
PQUA N° 1405-SENASA

PROFEZIN[®] es un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina de acción gradual y efectiva. Largo efecto residual. Baja toxicidad. Recomendado para el control de mosca blanca, queresas y cochinillas en hortalizas y frutales. Ideal para el control de “Planococcus” en el cultivo de Vid y Granado

COMPOSICIÓN

Buprofezin 250 g/kg

MODO DE ACCIÓN

PROFEZIN[®] es un insecticida agrícola que actúa por contacto e ingestión capaz y que actúa principalmente sobre insectos homópteros en ninfas penetrando en ellos por vía digestiva y por contacto. En estadios adultos reduce la capacidad de oviposición y la fertilidad de los huevecillos.

MECANISMO DE ACCIÓN

PROFEZIN[®] tiene un modo de acción único para insectos picadores y chupadores que es inhibiendo la síntesis de quitina en larvas, ninfas y suprime la oviposición en adultos; si el insecto adulto ha sido expuesto al producto coloca huevo esteriles

COMPATIBILIDAD

PROFEZIN[®] es compatible con los plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina y los que tengan propiedades bactericidas. Se recomienda realizar un ensayo de compatibilidad en pequeña escala antes de aplicar junto a otros productos.

TOXICIDAD DEL PRODUCTO: ligeramente peligroso

Oral en ratas :	$4702,52 \leq DL_{50} \leq 5500,89$ mg/kg de peso corporal
Dérmica en ratas:	$DL_{50} > 2000$ mg/kg de peso corporal
Inhalación en ratas :	$CL_{50} > 5,86$ mg/l de aire
Contacto ocular	Ligeramente irritante (Conejos)
Contacto con la piel	no irritante (Conejos)

METODO DE EMPLEO

Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN



Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

PROFEZIN® se puede aplicar hasta dos veces por campaña como máximo, con un intervalo que va de 14 a 21 días entre aplicaciones.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos

PRESENTACIÓN

Bolsa de 1 kilo

Bolsa de 200 gramos

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	kg/cil	kg/ha		
Mandarina	Queresa redonda	<i>Selenaspidus articulatus</i>	0.2	1.2	21	-
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2	-	1	2.0
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.2	-	21	0.05

PC: Período de carencia
L.M.R. Límite máximo de residuos

Productor:



País

China