

Exclusive® 75 PM

Insecticida

PQUA N° 1874-SENASA

Exclusive® es un insecticida sistémico, regulador de crecimiento, que inhibe el desarrollo larval como también las sustancias que gobiernan la muda de las larvas, deteniendo así el proceso de metamorfosis. Tiene efecto sobre el género díptera y particularmente a la especie *Liriomyza* spp.

COMPOSICIÓN

Ciromazina 750 g/kg

MODO DE ACCIÓN

Exclusive® aplicado sobre las plantas su acción es sistémica; aplicado sobre las hojas tiene un fuerte efecto translaminar, aplicado sobre el suelo, es tomado por las raíces de las plantas y traslocado de forma acropétala rápidamente.

MECANISMO DE ACCIÓN

La Ciromazina interfiere con la formación de la piel de la larva (afectando el proceso de muda).

- Efecto sobre pupas: Larvas afectadas por la ciromazina que llegan a pasar al estado de pupa, generan pupas deformes y no completan su desarrollo.
- Efecto sobre adultos: Al ser ingerida por las hembras, evita que estas coloquen huevos (efecto transovarial).
- No afecta a los insectos adultos (no tiene efecto de contacto).

COMPATIBILIDAD

Exclusive® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

TOXICIDAD DEL PRODUCTO: Ligeramente Tóxico

Toxicidad Oral:	LD ₅₀ (rata) > 3000 mg/kg
Toxicidad Dérmica:	LD ₅₀ (rata) > 3170 mg/kg
Toxicidad por Inhalación:	LC ₅₀ (rata) 1.6 - 6.0 µm (aire 4h)
Irritación Cutánea:	Moderadamente irritante
Irritación ocular:	Mínimamente irritante

MÉTODO DE EMPLEO

Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **Exclusive®** sobre campos de papa una vez que se ha detectado la presencia de la plaga.

RECOMENDACIÓN BÁSICA

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIÓN

Sobre de 200 gramos

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		Periodos de carencias	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	g/cil 200 litros	g/ha		
Papa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	140	7	0.5
Tomate	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	140	7	0.5
Alcachofa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	140	7	2.0
Haba	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	140	7	0.5
Frejol	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	140	7	0.5
Holantao	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensi</i>	70	140	7	0.5

PC: Período de carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos

Productor:



País de origen:

Gran Bretaña